

CRAFFT-II مقابلة الفحص

ابدأ: "سوف أطرح عليك بعض الأسئلة التي أطرحها على المرضى لدي. أرجو أن تكون صادقاً في الرد. سوف أجعل إجاباتك سرية".

الجزء أ

ضع 0 إذا لم تستخدمها



أثناء الاثني عشر شهراً الماضية، كم عدد الأيام التي قمت فيها بما يلي:

1. شربت أكثر من رشفة من البيرة أو الخمر أو أي مشروب آخر يحتوي على الكحول؟
2. تعاطيت ماريجوانا (على سبيل المثال العشب أو الحشيش) أو ماريجوانا كيميائية (مثل K2 أو سبايس)؟
3. تناولت وصفة طبية أو حبوب لم تكن موصوفة لك أو جرعة أكثر مما هو مصوف لك (على سبيل المثال مسكنات الألم أو أدوية ADHD)؟
4. تعاطيت أي شيء كيف تصحح مزاجك؟ (على سبيل المثال، مخدرات غير قانونية أو جرعة زائدة من الأدوية أو أشياء تشمها أو تستنشقها)؟

هل أجاب المرضى برقم "0" على كل الاسئلة في الجزء أ؟

نعم → اطرح سؤال السيارة فقط ثم توقف

لا → اطرح أسئلة CRAFT الستة المذكورة أدناه

لا نعم

الجزء ب

1. هل ركبت سيارة من قبل يقودها شخص (بما في ذلك أنت والذي كان تحت تأثير المخدر أو كان يتعاطى الكحول أو المخدرات؟

2. هل تعاطيت الكحول أو المخدرات من أجل الإسترخاء أو لتشعر بشكل أفضل حيال نفسك، أو لتكون متكيفاً مع الوضع؟

3. هل تعاطيت الكحول أو المخدرات عندما كنت وحدك؟

4. هل نسيت شيء فعلتها بينما كنت تتعاطى الكحول أو المخدرات؟

5. هل تخبرك أسرتك أو أصدقائك أنه يجب عليك أن تطلع عن تعاطي الكحول أو المخدرات؟


6. هل وقعت في مشكلة من قبل بينما كنت تتعاطى الكحول أو المخدرات؟

تقترح اجابتان بنعم وجود مشكلة خطيرة وتحتاج إلى تقييم إضافي.

انظر المزيد من التعليمات →

1. اعرض على مريضك درجته على الرسم البياني وناقش معه مستوى الخطوة الخاص باضطراب تعاطي المخدرات.

احتمالية وجود اضطراب تعاطي المخدرات DSM-5 من خلال درجة CRAFT



*مصدر البيانات: Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O'Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. 2014. النقاط الفاصلة في CRAFT معايير الدليل الإحصائي للإضطرابات النفسية DSM-5 للكحول والمخدرات: إعادة التقييم وإعادة الفحص. تعاطي المخدرات 35(4), 376-80.