

La Entrevista de Revisión CRAFFT-II

Comenzar: "Voy a hacerle un par de preguntas que hago a todos mis pacientes. Por favor, se honesto. Voy a mantener la confidencialidad de sus respuestas".

Parte A

**Durante los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿cuántos días usted...:
no hay uso**

Ponga 0 si



1. ¿Bebió más que unos pocos tragos de cerveza, vino o cualquier bebida alcohólica?
2. ¿Utilizó cualquier marihuana (por ejemplo, "pot, weed, o hash") o "marihuana sintética" (por ejemplo, "K2" o "Spice")?
3. ¿Tomó un medicamento de prescripción o píldora que no haya sido recetado a usted o más de lo prescrito a usted (por ejemplo, pastillas de prescripción para el dolor o medicamentos para el ADHD)?
4. ¿Utilizó cualquier otra cosa para drogarse? (Por ejemplo, otras drogas ilegales, medicamentos de venta libre, y las cosas que hueles o "huff")?

¿La respuesta del paciente fue "0" para todas las preguntas de la Parte A?

Si → **Hacer pregunta del COCHE solamente, y luego pare**

No → **Hacer todas las 6 preguntas CRAFFT* que siguen abajo**

Parte B

NO

SI

1. ¿Alguna vez has estado en un **COCHE** conducido por alguien (incluso tú mismo que estaba "high" o había estado usando alcohol o drogas?


2. ¿Alguna vez consumió alcohol o drogas para **RELAJARSE**, sentirse mejor consigo mismo, o porque los demás también estaban usando?
3. ¿Alguna vez consumió alcohol o drogas estando **SOLO**?
4. ¿Alguna vez se **OLVIDA** de las cosas que hizo durante el uso de alcohol o drogas?
5. ¿Su **FAMILIA** o **AMIGOS** le dicen que debe dejar su consumo de alcohol o drogas?

6. ¿Alguna vez se ha metido en **PROBLEMAS** mientras usando alcohol o drogas?

* Dos o más respuestas “SÍ” sugieren un problema serio y la necesidad de una evaluación adicional. Vea atrás para más instrucciones →

1. Muestre su paciente a su puntuación en el gráfico y discuta el nivel de riesgo de sufrir un trastorno del uso de sustancias.

Probabilidad de un trastorno por uso de sustancias del DSM-5 según puntuación de CRAFFT *



*Data source: Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O’Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). The CRAFFT cut-points and DSM-5 criteria for alcohol and other drugs: a reevaluation and reexamination. *Substance Abuse*, 35(4), 376-80.

The Center for Adolescent Substance Abuse Research (CeASAR) at Boston Children's Hospital For more information, contact ceasar@childrens.harvard.edu or see www.crafft.org (617) 355-5433 © John R. Knight, MD, Boston Children's Hospital, 2015. All rights reserved. Reproduced with permission.