

Escuelas Públicas de Lynn
Servicios de Salud Escolar
Directrices para Dejar a su Hijo En Casa Durante Días Escolares

Fiebre

Para una temperatura medida por boca de 100° o más, mantenga a su hijo en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, como Acetaminofén (Tylenol) o Ibuprofen (Motrin o Advil).

Vómito

Mantenga a su niño en casa por 24 horas después del último episodio y hasta que el niño pueda comer alimentos y líquidos sin vomitarlos.

Diarrea

Mantenga en casa hasta que no haya síntomas durante 24 horas.

Erupción

Erupciones pueden tener muchas causas diferentes. Si la erupción es inusual o acompañada con fiebre, su médico deberá hacer un diagnóstico y proporcionará una nota para que su hijo pueda regresar a la escuela.

Resfríos, Tos, Nariz que Moquea

Si su hijo no tiene fiebre, está tosiendo o estornudando con poca frecuencia, y es capaz de manejar las secreciones, puede asistir a la escuela. Por favor, mantenga a su hijo en casa si está cansado o agotado, tiene una tos congestionada o incontrolable o secreciones excesivas.

Asma

Si su hijo tiene sibilancias, tos, dificultad para respirar o presión en el pecho que no mejora después de tomar un medicamento de alivio rápido, por favor mantenga a su hijo en casa y comuníquese con su proveedor de atención médica.

Dolor de Garganta

Si el dolor de garganta es acompañado con fiebre, inflamación de las glándulas, dolor o dificultad para tragar, solicite que su hijo sea visto por su médico.

Dolor de Estómago

Mantenga a su hijo en casa si tiene dolor que dura más de 2 horas y / o fiebre, vómitos o diarrea.

Dolor de Cabeza, Dolor de Oído, Dolor de Muelas

Su hijo puede asistir a la escuela si el dolor puede ser controlado por medicamentos sin receta mientras espera una cita con el dentista o el médico. El niño debe quedarse en casa en situaciones con el dolor severo.

Ojos Rojos o Secreción de los Ojos

Si la parte blanca del ojo es roja, pica y tiene una descarga amarilla, verde o crujiente, su hijo debe ser evaluado por su proveedor de atención médica.

